

Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA) – Klassifikasjonskriterier.

Klassifikasjon av barneleddgikt

ACR Juvenil revmatoid artritt (JRA)	EULAR Juvenil kronisk artritt (JCA)	ILAR Juvenil idiopatisk artritt (JIA)
Systemisk	Systemisk	Systemisk
Polyartikulær	Polyartikulær JCA	Polyartikulær RF-
	Juvenil RA	Polyartikulær RF+
Pauciartikulær	Pauciartikulær	Oligoartikulær, persisterende
		Oligoartikulær, utvidet
	Juvenil psoriasis artritt	Psoriasis artritt
	Juvenil ankyl. spondylitt	Entesittrelatert artritt

ILARs klassifikasjonskriterier:

(Petty et al: ILAR classification of JIA; J Rheumatol 2004; 31:390-392)

ILAR's kriterier danner bro mellom tidligere amerikanske og europeiske kriterier, og synes gradvis å ha blitt vidt akseptert over hele verden.

1. Systemisk artritt

2. Oligoartikulær artritt

a. Persisterende oligoartikulær artritt

b. Utvidet oligoartikulær artritt

3. Polyartikulær artritt RF-

4. Polyartikulær artritt RF+

5. Psoriasis artritt

6. Entesitt relatert artritt

7. Udifferensiert artritt

Eksklusjonskriterier.

a. Psoriasis hos pas el 1. gradsslektning

b. Artritt hos en HLA B27 pos gutt med start før 6 års alder

c. Ankyloserende spondylitt, entesitt relatert artritt, sakroilitt med IBD, Reiter el akutt fremre uveitt hos pas el 1.gradsslektning.

d. RF IgM pos 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom

e. Systemisk JIA

1. Systemisk artritt.

- Artritt i 1 eller flere ledd
- Svingende feber over 39 i over 2 uker
- Og minst en av følgende:

1. flyktig erythematøst utslett
2. generell lymfeknutesvulst
3. hepato- eller splenomegali
4. serositt

2. Oligoartikulære.

Artritt som affiserer 1-4 ledd i løpet av de 6 første måneder av sykdommen.

- a. Persisterende oligoartikulære.
- b. Utvidet: Oligo debut, polyartikulært forløp. Angriper mer enn 4 ledd etter 6 måneder med sykdom.

Eksklusjon: a, b, c, d, e.

3. Polyartikulær RF-.

Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første 6 måneder av sykdommen, og er RF -.

4. Polyartikulær RF+.

Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første 6 måneder av sykdommen, og er RF+ 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom.

Eksklusjon: a, b, c, e.

5. Psoriasis artritt.

Artritt og psoriasis,
eller artritt og minst 2 av følgende:

1. Daktylitt
2. Negl pitting eller onycholyse
3. Psoriasis hos 1.grads slektning

Eksklusjon: b, c, d, e.

6. Entesittrelatert artritt.

Artritt og entesitt,
eller artritt eller entesitt med minst 2 av følgende:

1. Iliosakralleddsømhet el. inflammatoriske rygg smerter
2. HLA B27
3. Debut av artritt hos gutt over 6 år
4. Akutt fremre uveitt med rødhet og smerter
5. Positiv familieanamnese hos 1.gradsslektning på ankyloserende spondylitt, sacroilitt v. IBD,

Reiter, akutt fremre uveitt.

Eksklusjon: a, d, e.

7. Uspesifisert JIA.

Passer ikke inn i noen av kriteriene,
eller
kan klassifiseres på flere måter.