

Oversikt over variabler ved OUS smerteregister

		OPR v1 (Okt. 2015 til desember 2020.)			OPR v2 (fra desember 2020)*	
		Baseline	12 mnd oppflg†	36 mnd oppflg‡	Baseline	12 mnd‡
Demografi	Alder, kjønn, sivilstand, utdanning, arbeidssituasjon	x	x (arbeidssit.)	x (arbeidssit.)	x (+vekt/høyde/røyk)	x (arbeidssit.)
Oswestry - Funksjonsbegrensninger		x	x	x	x	x
Smertelokalisasjon		x (10 regioner)			x (21 regioner)	
Numerisk smerteskala sist uke	Smerteintensitet: Høyeste, vanligste, laveste, nå	x				
Smertevariasjon og anfall	Tidsaspekt på variasjon/anfall, intensitet på anfall				x	x
Smerte knyttet til berøring og trykk	Intensitet på berøring/trykk				x	x
EQ-5D-5L	Livskvalitet	x	x	x	x	x
HSCL-25	Symptomer på angst og depresjon	x				
Numerisk smerteskala, vanligvis	Intensitet, plagsomhet, varighet av smerter og tidsaspekt	x	x	x	x	x
Gøteborgsspørsmålet	Aktivitetsnivå, selvrapporert	x				
Selvopplevd helse	Ett egenrapportert spørsmål	x			x	
GSE	Mestringstro	x				
BDS	Bodily distress syndrome	x			x	
IEQ	Opplevd urettferdighet	x			x	
Fatigue Questionnaire	Utmattelse/Fatigue	x				
Insomnia Severity Index (ISI)		x			x	
Pain catastrophizing scale		x			x	
PGIC	Opplevelse av endring		x	x		x
PHQ-4	Angst og depresjon + suicid				x	
Søvn mønster	Leggetid, timer søvn				x	
BFI-20	Personlighet				x	
Selvrapporert, funksjon/aktivitet	(Fritekst)				x	
ICD-10 og ICD-11	Diagnose				x	
NCMP	Prosedyrekode				x	

* Ny teknisk løsning, datasett fra OPR v1 og v2 må eventuelt slås sammen.

† 12 mnd etter første oppmøte.

‡ 12 mnd etter avsluttet behandling, alternativt hver 12. mnd under pågående behandling.