Oslo universitetssykehus

Forlikelighetstabell, vedlegg til **Forlikelighet av intravenøse legemidler i sentrale og perifere innganger**, Dok-ID: 26943

	pH
Acetylcystein	7,0
Adrenalin	3,0 – 3,8
Amiodaron	3,5 – 4,5
Deksmedetomidin	4,5 – 7,0
Dobutamin	2,5 – 5,5
Dopamin	2,5 – 4,0
Esketamin	3,0 – 5,0
Esomeprazol	8,5 – 11,0
Fentanyl	5,0 – 7,5
Fenylefrin	4,5 – 6,5
Furosemid	8,9 – 9,3
Glukose 50 mg/ml	4,0 – 5,0
Glukose 100 mg/ml	4,0 – 5,0
Glukose 200 mg/ml	4,0 – 5,0
Glukosel	3,5
Glyseroltrinitrat	3,0 – 7,0
Heparin	5,0 – 8,0
Insulin	7,0 – 7,8
Kaliumdihydrogenfosfat	6,2 – 7,8
Kaliumklorid	4,5 – 7,5
Ketamin	3,5 – 5,5
Klonazepam	3,8 – 4,5
Klonidin	4,0 – 7,0
Labetalol	3,5 – 4,5
Levosimendan	3,5 – 4,0
Lidokain	4,0 – 7,0
Magnesiumsulfat	4,5 – 7,0
Metoprolol	5,0 – 8,0
Midazolam	2,9 – 3,7
Morfin	3,0 – 5,0
Natriumklorid 9 mg/ml	4,5 – 7,0
Nimodipin	6,8
Nitroprussid	3,5 – 6,0
Noradrenalin	3,0 – 4,5
Oksykodon	4,8 – 5,2
Pantoprazol	9,0 – 11,5
Paracetamol	4,5 – 5,5
Propofol	6,0 – 8,5
Remifentanil	2,5 – 3,5
Tiopental	10,2 – 11,2
Valproat	7,0 – 9,0
Vasopressin	2,4 – 4,5



Slik bruker du tabellen:

= Legemidlene er forlikelige

= Legemidlene er **IKKE** forlikelige

= Mangler data. Ikke anta forlikelighet. Kontakt farmasøyt eller lege

Følgende forutsetninger gjelder ved bruk av forlikelighetstabellen:

- Legemidlene er forlikelige i alle konsentrasjoner
- Forlikelighet er kun sjekket mellom kombinasjoner av to legemidler i NaCl 9 mg/ml og/eller Glukose 50 mg/ml
- Ved spørsmål om forlikelighet i andre infusjonsvæsker, inkludert ernæring, må produsentens egne data sjekkes eller farmasøyt kontaktes

Husk!

1. Jevnlig kontroll av slanger/løp
2. Å sjekke hvorvidt infusjonsvæskene er forlikelige med begge legemidlene
3. Gis det bolus av et legemiddel vil dette også gi en høyere hastighet av andre legemidler i samme løp/lumen