

Henvisning og utredning

NKIR-utredning v uroterapeut og gynekolog

Informasjon om at Bulkamid er et «pakkeforløp» der noen trenger kun 1 behandling mens andre trenger 2

Et pakkeforløp med Bulkamid bør ta max 12 mnd. fra 1. behandling til 2. behandling

Første Bulkamidbehandling

Gir informasjon om at pasienten bør ringe etter 1-2 mnd. dersom ønske om ny behandling ved utilstrekkelig effekt

(Evt. sykehuset ringer pasienten etter 2 mnd.)

Andre Bulkamidbehandling

Tidligst etter 2 mnd. hos de som melder om behov selv

Så raskt som mulig hos de som fanges opp v kontroll

Ny utredning ikke nødvendig

Kontroll Telefonkontroll/fysisk kontroll

- Dersom det IKKE avtales ny Bulkamid skal pasienten til vanlig 6-12 mnd kontroll hos lege eller uroterapeut.
- Dersom det bestemmes at pasienter med kun 1 Bulkamidbehandling trenger påfyll, skal ikke dette registreres som halvtårskontroll

NKIR-teknisk:

Ny operasjon på tidligere operert pasient opprettes
NKIR-ansvarlig flagger Bulk med NKIR-deltagelse 7 =
kontroll unødvendig grunnet planlagt ny operasjon

Behandlingstrengende stressinkontinens etter 2 runder Bulkamid

Ny utredning (minimum 24 t test og stresstest)

Vurder evt slynge/annen metode

