

ANALYSENYTT

Desember 2016

Hormonlaboratoriet har tatt over analysering av PIIINP fra MED Endokrinologisk Laboratorium, Rikshospitalet fra 01.11.2016.

Hormonlaboratoriet har begynt å analysere Intakt N-terminalt propeptid type III prokollagen (PIIINP) med RIA metode fra Orion Diagnostica. Metoden er tatt over fra Rikshospitalet og referansegrenser er videreført derfra.

Analysering av PIIINP brukes først og fremst til å følge psoriasis pasienter på Methotrexat behandling i forhold til risiko for utvikling av leverfibrose.

Pasienter behandlet med Methotrexat bør vurderes for leverbiopsi/henvisning til hepatolog hvis PIIINP er:

- > 8,0 µg/l ved baseline
- > 4,2 µg/l i >3 målinger/år
- > 8,0 µg/l i 2 målinger etter hverandre

(Manchester guidelines)

Prøvemateriale: 1 ml **frosset serum**.

Kryss av på rekvisisjonen for andre analyser og påfør PIIINP.

Forsendelse med bud:

Prøvematerialet leveres Hormonlaboratoriet, bygg 23,
Oslo Universitetssykehus HF, Aker,
Trondheimsveien 235,
0586 Oslo

Forsendelse med vanlig post:

Prøvematerialet sendes til Hormonlaboratoriet,
Oslo Universitetssykehus HF, Aker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

