

Anbefalinger til foresatte/barn med revmatisk sykdom vedrørende koronavirus - COVID-19 per 17.03.20.

1. Hold deg oppdatert og følg anbefalinger fra nasjonale myndigheter (folkehelseinstituttet.no og helsenorge.no).
2. Følg nøye alle hygieneanbefalinger. Koronavirus kan overleve i flere dager på overflater som håndtak, dørhåndtak, lysbrytere, mobiltelefoner, tastaturer, fjernkontroller, nøkler, heisknapper, toaletter, vasker, bord, etc.

Enkle tiltak kan beskytte deg og andre:

- Vask hendene dine ofte og i minst 30 sekunder med såpe og vann. Tørk hendene grundig etterpå.
 - Forsøk å unngå å berøre ansiktet ditt.
 - Host eller nys i papir som kastes etter bruk, alternativt i albuen.
 - Bruk av ansiktsmaske anbefales ikke utenfor helsetjenesten, unntak er personer som pleier andre familiemedlemmer som er syke.
 - Hold fornuftig avstand til andre mennesker. En meter anbefales.
 - Unngå håndhilsning og klemmer.
3. Barn med revmatiske sykdommer skal fortsette å bruke sine faste medisiner, inkludert metotreksat og biologiske medikamenter. Ikke slutt med medisiner uten å konsultere din behandlende lege. Det kan føre til at sykdommen din blusser opp.
 4. Barn i isolasjon eller karantene uten symptomer fortsetter med medisinsk behandling som før.
 5. Hvis du bruker kortikosteroider (prednisolon) - ta kontakt med behandlende lege for eventuell dosejustering.
 6. Ved feber og mistanke om smittsom sykdom, følg gjeldende råd for å oppsøke helsehjelp. Det er ikke nødvendig å teste for COVID-19 hvis du ikke trenger innleggelse på sykehus.
 7. Hvis du får feber og luftveissymptomer bør metotreksat og biologiske medikamenter utsettes til du er feberfri eller situasjonen er avklart, i maks 1-3 uker. Kontakt behandlende lege for veiledning dersom du er i tvil.

8. Hvis du har en rutinemessig kontrolltime hos behandlende lege, spør om dette er viktig eller er forsvarlig å utsette, eller om kontrollen kan utføres via telefon eller videokonsultasjon.
9. Barn med revmatiske sykdommer bør som alle andre unngå unødvendige reiser, men anbefales å gå i barnehage og skole som andre barn når disse eventuelt åpner.
10. Behold roen og unngå unødig engstelse. Erfaringene fra Kina og Italia tilsier at svært få barn får alvorlig sykdom, og det er så langt ikke rapportert dødsfall hos barn. Det er eldre som er mest utsatt ved COVID-19.

Anbefalingene er basert på PReS (Pediatric Rheumatology European Society) sine retningslinjer og tilpasset norske forhold av Interessegruppe for Barne – og ungdomsreumatologi i Norsk barnelegeforening og NAKBUR (Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsreumatologi) v/ Ellen Nordal, Nils Thomas Songstad, Mona Røisland, Berit Flatø, Pernille Bøyesen, Helga Sanner, Marite Rygg, 17/03/20.

Se også

PReS nettsted:

<https://www.pres.eu/news/newsstory.html?id=29>

European League Against Rheumatism, EULARs nettsted:

https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm