

GONIOMETER (VINKELMÅL)

Type test:	Vurdering av leddbevegelse
Målgruppe:	Pasienter med plager i muskel- og skjelettapparatet.
ICF-nivå:	Kroppsnivå
Anvendes av:	Anvendes primært av fysioterapeuter og ergoterapeuter
Kort beskrivelse:	Goniometer brukes for å måle leddbevegelse, både som kartlegging og til å vurdere endring i leddbevegelse etter intervensjon. Goniometer finnes i ulike størrelser. Det finnes beskrivelse av normal leddbevegelse ved ulike alder (Norkin & White 2003).
Anskaffelse:	Forhandlere som selger fysioterapiutstyr.
Testet for reliabilitet, validitet, sensitivitet:	Det er beskrevet at leddbevegelse målt med goniometer er et reliabelt instrument for å måle leddbevegelse hos barn med leddgikt, men med standardfeil på 5° (Scull 2000).

Norkin CN & White DJ (2003). Measurement of joint motion. A guide to goniometry. Third edition. Philadelphia, PA : F.A. Davis Company.

Scull SA (2000). Juvenile rheumatoid arthritis. I: Campbell SK, Vander Linden DW, Palisano RJ. Physical therapy for children. Second edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company.