

## Takayasu arteritt – Klassifikasjonskriterier.

### Hovedkriterie:

Unormalt arteriogram (konvensjonell angio, CT eller MR angio) av aorta eller dens hovedgrener.

I tillegg til dette skal minst 1 av de følgende 4 være tilstede:

1. Redusert perifer arteriepuls og/eller klaudikatio i ekstremiteter
2. Blodtrykkforskjell > 10 mmHg, høyre kontra venstre overarm
3. "Dusjlyd" over aorta eller dens hovedgrener
4. Hypertensjon (i forhold til alder og normative data)

(S Ozen et al., Ann Rheum Dis 2006;**65**:936-941.)

### Definisjoner.

Klaudikatio i ekstremiteter	Utvikling eller forverring av tretthet eller ubehag i muskulaturen i en eller flere ekstremiteter ved aktivitet, spesielt overekstremiteter.
Redusert arteriepuls	Redusert pulsasjon i en eller begge a. barchialis.
Blodtrykkforskjell > 10 mm Hg	Forskjell i systolisk blodtrykk mellom overekstremitetene på >10 mm Hg.
"Dusjlyd" over aorta eller dens hovedgrener	Hørbar "dusjlyd" ved auskultasjon over en eller begge a. subclavia eller abdominal aorta.
Unormalt arteriogram	Arteriografisk innsnevring eller okklusjon av hele aorta, dens hovedgrener eller store arterier i proksimale deler av over- eller underekstremiteter, som ikke skyldes arteriosklerose, fibromuskulær dysplasi eller lignende tilstander. Forandringene er vanligvis fokale eller segmentale.

(Arend WP, Michel BA, Bloch DA, et al: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Takayasu arteritis. Arthritis Rheum 33:1129-1132, 1990, with the permission of the American College of Rheumatology.)