

## Wegener's Granulomatose – Klassifikasjonskriterier

3 av de følgende 6 skal være tilstede:

1. Unormal urinanalyse\*
2. Granulomatøs inflammasjon ved biopsi
3. Nasal-sinus inflammasjon (bihulebetennelse)
4. Subglottis, trakeal eller endobronkial stenose
5. Unormalt røntgen thorax eller CT
6. PR3 ANCA eller C-ANCA

\* Ved nyrebiopsi vises karakteristisk nekrotisert pauci-immun glomerulonefritt.

(S Ozen et al., Ann Rheum Dis 2006;**65**:936-941.)

### Definisjoner.

Nasal eller oral inflammasjon	Utvikling av orale ulcera eller purulent eller blodig nasalt sekret, med eller uten smerter
Unormalt røntgen thorax	Røntgen thorax viser noduler, organiserte infiltrater eller hulrom
Urinsedimenter	Mikrohematuri (>5 røde blodlegemer pr. synsfelt) eller røde blodlegemesylindre i urinsediment
Granulomatøst infiltrat ved biopsi	Histologiske forandringer som viser granulomatøs inflammasjon i arterieveggen eller i et perivaskulært eller ekstravaskulært område (arterie eller arteriole)

(Leavitt RY, Fauci AS, Bloch DA, et al: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener's granulomatosis. Arthritis Rheum 33:1101-1107, 1990, with permission of the American College of Rheumatology.)